



**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0264/MRA/ ES / APP (NA) -2018-18-00546**

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 27.02.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: SPANIA
- Nr. Autorizației din statul membru emitent: ES / APP (NA) -2018-18-00546

II. Data emiterii autorizației: 27.03.2020

III. Data expirării autorizației: 11.10.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: FOVAL GEL GANDACI

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: KOLLANT S.R.L.

Via C.Colombo, 7/7A, cod postal 30030, Vigonovo, Italia

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A. Calle Mendez Álvaro, 20 -5 28045 MADRID Tel: (+34) 91 585 23 80 Web: www.adama.com

Locația unității de producție:

MYLVA, S.A. - San Galderic 23 08395 San Pol de Mar,

Barcelona, Spania

COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A. - P.I. San Pere Molanta

Avda. del Cadí 7-14 08799 Olerdola (Barcelona), Spania

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: ADAMA Celsius, B.V. Amsterdam.(NL)

Adresa producătorului: Member of Makhteshim Agan Ind.Group Spitalstrasse, 5 8200 Schaffhausen
Suiza

Adresa loc producție 1: MYLVA, S.A. San Galderic 23 San Pol de Mar 08395, Barcelona España

Adresa loc producție 2: COMERCIAL QUIMICA MASSÓ, S.A. P.I. San Pere Molanta Avda. del Cadí
7-14 08799 Olerdola (Barcelona) España

NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA: BAYER CROPSCIENCE ag

Adresa producătorului : 16 rue Jean-Marie Leclair 90106 Lyon Cedex (Franța)

Adresa loc producție: Industrial Operations Alfred-Nobel-Strabe 50 40789 Monheim (Germania)

ADAMA AGRICULTURE ESPAÑA, S.A

Adresa producătorului : Calle Mendez Álvaro, 20 -5 28045 Madrid - Spania



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Adresa loc productie 1: Makhteshim Chemical Works Ltd. Ramat Hovak-Industrial Zone Beer Sheva 84100, Israel
Adresa loc productie 2: Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd 39 Wenfeng Road Yangzhou 225009 China

VI.

TIPUL DE PRODUS TP18 – Insecticide, acaricide si produse pentru combaterea altor artropode.

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: public general, profesional, profesional instruit

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Gel momeala

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ

1)Substanta activă


a) substante chimice

Denumirea IUPAC	Imidacloprid
Numar CAS	138261-41-3
Numar CE	428-040-8
Continut de substantă activă	2,15%

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - substante chimice

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS09
Fraze de risc H	EUH 208 – Conține Imidacloprid. Poate provoca o reacție alergică. H410 – Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung
Fraze de prudență P	P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103 – Citiți eticheta înainte de utilizare P273 – Evitați dispersarea în mediu. P391 – Colectați scurgerile de produs. P501 - Aruncați conținutul/recipientul conform reglementărilor locale/instrucțiunilor de pe etichetă
Mentiuți: se vor preciza substantele care prezintă pericolozitate, dar care nu conduc la clasificarea produsului	-



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



XI. AMBALAREA

AMBALAREA PRODUSULUI

Utilizare în interior, crăpături și fisuri - Momeală gel aplicată ca picături - Public general (utilizator neprofesional).

Seringi din plastic LDPE de 3, 5, 10 și 20 g.

Utilizare în interior, crapaturi și fisuri - Momeală de gel aplicată ca picături, utilizatori profesioniști.

Seringi din plastic LDPE de 3, 5, 10 și 20 g.

Utilizare în interior, fisuri și crăpături - Momeală de gel aplicată ca picături, profesioniști instruiți.

Seringi din plastic LDPE de 3, 5, 10 și 20 g.

Cartuș de plastic LDPE de 30 și 35 g.

XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Folosiți numai în interior, în case particulare și clădiri publice (comerciale, rezidențiale, industriale).

Se aplică produsul biocid numai în crăpături și fisuri, în spatele mobilierului și a motoarelor.

Produsul nu poate fi utilizat pe suprafețe.

Nu expuneți picăturile de momeală la lumina soarelui sau la sursă de căldură (radiator).

Vă rugăm să contactați operatorii de combatere a dăunătorilor dacă infestarea persistă după tratament.

Nu aplicați pe suprafețe sau ustensile care pot fi în contact cu furaje/ produse alimentare.

Aplicarea momealii gel se face sub formă de picătură dintr-o seringă.

Frecvența aplicării: verificați punctele de momeală la fiecare 7-14 zile și reaplicați dacă momeala a fost consumată și infestarea persistă.

Nu aplicați de mai mult de patru ori pe punct de momeală în timpul tratamentului

Frecvența tratamentului: la trei luni de la sfârșitul infestării, tratamentul poate fi repetat.

Realizați o inspecție amănunțită pentru a determina nivelul de infestare (scăzut sau ridicat).

Citiți întotdeauna eticheta sau prospectul înainte de utilizare și respectați toate instrucțiunile furnizate.

Nu utilizați pe lemn sau pe suprafețe poroase.

Evitați contactul cu suprafețele tratate.

Nu amestecați cu alte substanțe chimice sau în zone tratate recent cu un alt insecticid.

Produsul trebuie reaplicat până când dăunătorul este controlat.

Pentru a optimiza eficacitatea tratamentului, respectați bunele practici de igienă: eliminați sau împiedicați accesul la toate sursele de hrană.

Momeala trebuie să fie principala sursă de hrană disponibilă pentru gândaci.

Pentru a optimiza eficacitatea, verificați momeala o dată pe săptămână și înlocuiți/ umpleți cu momeală dacă sunt deteriorate sau murdare.

Utilizați produsul la dozele și intervalele recomandate.

Periculos pentru albine.

Utilizați produsele la dozele și intervalele recomandate.

***Gândacul roșu de bucătărie*(*B. germanica*)**

În 15 zile de la aplicare

Public larg/Profesional: - 2-6 picături/ m² depinde de nivelul de infestare

Profesionali instruiți: - 0,04-0,16 g/m² (1-4 picături/ m²) depinde de nivelul de infestare

***Gândacul negru de bucătărie*(*B. orientalis*)**

În 21 zile de la aplicare



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID E

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Public larg/Profesional/Profesionali instruiți: 0,08-0,24 g/m²(2-6 picături/ m²) depinde de nivelul de infestare

Gândacul american(*Periplaneta americana*)

În 21 zile de la aplicare

Public larg/Profesional/Profesionali instruiți: 0,08-0,24 g/m²(2-6 picături/ m²) depinde de nivelul de infestare

Gândacul de mobilă(*Supella longipalpa*)

În 15 zile de la aplicare

Public larg/Profesional:2-6 picături/ m²- depinde de nivelul de infestare

Profesionali instruiți:0,04-0,16 g/m²(1-4 picături/ m²) depinde de nivelul de infestare.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE:

A se păstra în recipientul original.

Păstrați recipientul bine închis într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat.

Evitați lumina directă a soarelui.

A se ține departe de apă, hrană și hrană pentru animale.

Se recomandă păstrarea produsului la o temperatură de preferință cuprinsă între 5 ° C și 45 ° C

Stabilitatea la depozitare a acestui produs în recipientul său original este de 2 ani în condiții normale de depozitare.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID E ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE ALTE INFORMATII: 2 ani

Restricții pentru utilizarea produsului biocid

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizației a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

